

Behandelingen door de kaakchirurg bij kinderen

Onder narcose

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort wordt uw kind in ons ziekenhuis opgenomen voor een behandeling door de kaakchirurg. Er kunnen één of meerdere tanden of kiezen (gebitselementen) verwijderd moeten worden. Ook kan het om een andere behandeling gaan. In overleg met de kaakchirurg heeft u ervoor gekozen uw kind onder narcose (algehele anesthesie) te laten behandelen. Hiervoor wordt uw kind een aantal uren opgenomen.

De kaakchirurg heeft met u besproken hoe de operatie gaat, welke voorbereidingen nodig zijn en waar u na de operatie rekening mee kunt houden.

In deze folder kunt u thuis nog eens alles rustig nalezen en op uw manier aan uw kind uitleggen wat er gaat gebeuren. Tenslotte kent u uw kind het best.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat uw kind kan verwachten aan ongemak of pijn als uw kind een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder kind en iedere ouder dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u of uw kind ergens tegenop ziet of als u ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

Voor de opname

Pre-operatieve screening

Een aantal weken voor de operatie belt de anesthesioloog u. De anesthesioloog bespreekt de mogelijkheden van anesthesie en pijnbestrijding met u.

Soms is het nodig dat uw kind lichamelijk moet worden onderzocht, of is er aanvullend onderzoek nodig zoals bloedonderzoek, hartfilmpje (ECG) en een longfoto (thorax). U krijgt dan een afspraak om met uw kind op de pre-operatieve polikliniek te komen. Soms is het nodig dat ook een andere specialist de conditie van uw kind beoordeelt, bijvoorbeeld een kinderarts.

Voorlichting

De polikliniekassistent vertelt u op welke manieren we in ons ziekenhuis voorlichting geven over narcose bij kinderen.

Medicijngebruik

Als uw kind medicijnen gebruikt, moet u dit altijd doorgeven aan de kaakchirurg en anesthesioloog. Het is fijn als u een actueel overzicht van de medicijnen meeneemt. De kaakchirurg of anesthesioloog bespreekt met u of en hoelang voor de operatie uw kind tijdelijk moet stoppen met inname van de medicijnen.

Als er in de tijd tussen de pre-operatieve screening en de operatie iets verandert in de medicijnen van uw kind, vragen we u dit door te geven.

Overgevoeligheid en allergie

Als uw kind overgevoelig is voor medicijnen, bijvoorbeeld antibiotica, meldt u dit aan de kaakchirurg en anesthesioloog. Als u niet precies weet voor welke medicijnen uw kind overgevoelig is, kunt u dit via uw huisarts of apotheek proberen te achterhalen.

Opname in het ziekenhuis

Een medewerker van de Ok-planning bespreekt met u de datum van opname van uw kind. Ook krijgt u te horen op welke afdeling uw kind wordt opgenomen.

De dag voor u de opname belt u tussen 15.00-16.00 uur naar de afdeling waar uw kind opgenomen wordt. U hoort dan het tijdstip van de behandeling en het tijdstip waarop uw kind opgenomen wordt. Als uw kind op maandag wordt opgenomen, belt u de vrijdag ervoor.

Vorbereidingen thuis

- Koorts? Als uw kind op de dag van de opname koorts heeft (hoger dan 38°C), is de kans groot dat de operatie niet door kan gaan. Bel naar de afdeling waar uw kind opgenomen wordt. Achterin de folder vindt u de telefoonnummers.
- Tijdens de operatie mag uw kind geen sieraden, piercings, nagellak en make-up dragen. We raden u aan sieraden en piercings thuis te laten. Op de dag van behandeling geen bodylotion gebruiken.

Advies aan ouders

We raden ouders aan om op de dag van de operatie goed te ontbijten. Sommige ouders kunnen onwel worden en flauwvallen door bijvoorbeeld de spanning of door de niet-alledaagse omstandigheden. Als u ontbeten heeft is de kans hierop kleiner.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Het is handig als u voor uw kind de volgende dingen meeneemt:

- Een pyjama.
- Pantoffels.
- Reserve ondergoed.
- De medicijnen die uw kind thuis gebruikt in de originele verpakking.
- Eventueel een eigen drinkbeker met naam erop.
- Uiteraard mag uw kind een knuffel meenemen.

Wilt u eventuele broertjes of zusjes **niet** meenemen naar het ziekenhuis? Dit wordt al snel té druk.

De dag van de behandeling

Voor deze operatie moet uw kind nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn op de dag van de operatie, leest u in de folder 'Anesthesie en pre-operatieve screening bij kinderen' die u heeft gekregen.

De anesthesioloog heeft bij de pre-operatieve screening met u besproken welke medicijnen uw kind op de dag van de behandeling in mag nemen.

We verwachten uw kind op de Kinderafdeling of de Dagbehandeling. De afdeling Patiëntenregistratie laat u dit weten. De verpleegkundige of pedagogisch medewerker stelt u nog een aantal vragen. Verder krijgen u en uw kind informatie over het verloop van de opname. Uiteraard is het ook mogelijk om eigen vragen te stellen.

Voor de behandeling

Kinderen vanaf 12 jaar krijgen een operatiejasje aan. Jongere kinderen houden hun pyjama aan. Uw kind krijgt een naambandje om (arm of been).



Naar de operatieafdeling

- Tijdens de behandeling mag uw kind geen bril op of gehoorapparaat in. Het kan wel fijn zijn om tot het laatst toe goed te kunnen horen en zien. Daarom hebben we een speciaal bakje dat aan het bed gehangen kan worden. Daar kan dan de bril en/of gehoorapparaat in gedaan worden. Uw kind heeft ze dan meteen bij het wakker worden weer. U kunt de verpleegkundige hierom vragen.
- Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer en mag bij uw kind blijven totdat hij/zij slaapt. De verpleegkundige brengt u beiden naar de operatiekamer. Voor u de operatieafdeling in gaat, trekt u een overschort, muts en overschoenen aan.
- Op de operatie-afdeling wordt een infuus bij uw kind ingebracht. De anesthesioloog geeft uw kind de algehele anesthesie (narcose). Tijdens het in slaap vallen kan uw kind wat onrustig zijn. Dit is een normale reactie waar u zich geen zorgen over hoeft te maken.
- Zodra uw kind slaapt, brengt een verpleegkundige u terug naar de afdeling waar u kunt wachten tot de behandeling klaar is.

- De kaakchirurg geeft uw kind tijdens de narcose ook een plaatselijke verdoving. Deze verdoving vermindert het nabloeden en heeft een pijnstillende werking.

Na de behandeling

Op de uitslaapkamer

Na de behandeling gaat uw kind naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Als u wilt, brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer om weer bij uw kind te zijn. Op de uitslaapkamer controleren we regelmatig zijn/haar hartslag, de bloeddruk, het nabloeden van de wond. Soms is het nodig dat uw kind even op een gaasje bijt om het bloeden te stoppen.

Uw kind heeft een infuus in zijn/haar arm. Zodra uw kind goed wakker is en de controles goed zijn, brengen we hem/haar terug naar de afdeling.

Terug op de afdeling

Als uw kind na de behandeling pijn heeft of misselijk is, kan de verpleegkundige hier medicijnen voor geven.

Misschien is hij /zij nog wat suf of slaperig van de anesthesie of verdrietig of overstuur. Natuurlijk mag u uw kind op schoot nemen om te troosten.

Na de behandeling mag uw kind wat drinken en als dat goed gaat ook wat eten. Zodra hij voldoende drinkt, verwijderen we het infuus. En als uw kind zich goed voelt, mag hij/zij uit bed en spelen.

Nazorg

De wond

Als een tand of kies verwijderd is, wordt soms de wond gehecht. Deze hechting is oplosbaar. Het kan 2-3 weken duren voordat de hechtingen zijn opgelost.

Er wordt na de behandeling een gaasje op de wond gedaan. Hier moet uw kind een half uurtje op bijten. Daarna kunt u het gaasje weggooien.

Tijdens de eerste 24 uur mag de wond niet gespoeld worden, zoals uw kind na het tandenpoetsen doet. Dit vergroot de kans op nabloeden. Tandpoetsen mag wel, maar voorzichtig bij de wond! Liever niet spugen, als het weer gaat bloeden laat u uw kind dan weer bijten op een gaasje.

Als de kaakchirurg het nodig vindt, krijgt u voor uw kind een recept mee naar huis voor extra pijnstillers. Deze pijnstillers mogen naast de paracetamol worden ingenomen.

Extra aandachtspunten:

- We raden u aan om uw kind de eerste dag pijnstillers te geven. U kunt daarbij de voorschriften van de verpakking opvolgen.
- U moet erop letten dat uw kind niet aan de binnenkant van de wang bijt en niet op zijn/haar lippen bijt. Door de verdoving kunnen de lippen namelijk vreemd aanvoelen, waardoor juist kinderen op hun lippen kunnen gaan bijten.
- Geef uw kind geen zuigfles. Door het zuigen aan een fles (en daarmee aan de wond) is er een grotere kans op nabloeden.
- Let u erop dat uw kind zijn of haar mond niet spoelt. Houdt u bovenstaande regels over de mondhygiëne aan.

Eten en drinken

Het eten en drinken moet de eerste 24 uur koud of lauw van temperatuur zijn. Te warm eten en/of drinken kan een nabloeding veroorzaken. Geef uw kind zacht eten, bijvoorbeeld een boterham zonder korst.

Wond spoelen

Soms krijgt u voor uw kind een spuitje mee om de wond te spoelen. Dit spuitje wordt meestal meegegeven na het trekken van kiezen uit de onderkaak. Vanaf de derde dag na de behandeling spoelt u de wond uit met het spuitje gevuld met lauwwarm water. Dit doet u na elke maaltijd. U mag een half theelepeltje zout aan het lauwe water toevoegen. Dit kan de pijn wat verzachten.

Zwelling

Door de behandeling kan de wang en/of lip flink gaan zwellen, zeker als er geboord is. Dit is een normaal gevolg van de behandeling. Zo nodig begint uw kind op de verpleegafdeling al met het koelen van zijn of haar wang/lip.

Thuis kunt uw kind gaan koelen door een washandje gevuld met ijsklontjes tegen zijn/haar wang te houden. U kunt hiervoor ook een coldpack gebruiken. U kunt afwisselend 15 minuten wel en 15 minuten niet koelen. Dit blijft u doen tot uw kind naar bed gaat.

Antibiotica

Na sommige (uitgebreide) behandelingen of als er een ontsteking is, krijgt u voor uw kind een recept mee voor antibiotica.

Lichamelijke inspanning

De eerste 2 tot 3 dagen na de behandeling moet uw kind rustig aan doen. Sporten mag dan ook niet omdat een bepaalde houding of activiteit klachten geeft. Zware lichamelijke inspanning vergroot de kans op nabloeden.

Normale bijverschijnselen

- Enig nabloeden tijdens de eerste twee dagen.
- Forse zwelling mogelijk tot 2-3 dagen na de behandeling. De zwelling moet verdwijnen na 7-10 dagen.
- Temperatuursverhoging is mogelijk tot 3-4 dagen na de behandeling.
- Pijn tot ongeveer een week na de behandeling.
- Beperkte opening van de mond, tot ongeveer 10 dagen na de behandeling.
- Enige pijn bij het slikken.

Een arts waarschuwen

U belt de arts als uw kind last krijgt van:

- Koorts boven 39°C.
- Een forse nabloeding.
- Een forse toename van de zwelling en slikklachten.

De polikliniek Kaakchirurgie is op werkdagen van 08.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur telefonisch bereikbaar, via tel. (078) 652 37 71. 's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u bij acute problemen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk: tel. (078) 652 32 10. De afdeling Spoedeisende Hulp neemt dan contact op met de dienstdoende kaakchirurg.

Complicaties

Blijvende ongevoeligheid van een deel van de onderlip of de tongrand is een complicatie die weinig voorkomt. De kaakchirurg zal dit vooraf bespreken. Dit geldt vooral bij verwijdering van (verstand)kiezen in de onderkaak.

Soms liggen de wortels van de verstandskiezen in de bovenkaak dicht bij de neusbijholten. Hierdoor kan er tijdens de behandeling een open verbinding ontstaan naar de neusbijholte.

Als dit zo is, wordt de nazorg anders. Er mag dan geen druk op de wond ontstaan. Uw kind mag dan 10 dagen lang niet persen, hoesten, niezen en/of snuiten. Bovendien moet uw kind dan vijf dagen stomen of de neus druppelen.

Naar huis

Meestal mag uw kind dezelfde dag weer naar huis. Soms wordt er eerst nog een controle-foto gemaakt op de polikliniek Kaakchirurgie. Uw kind wordt dan vanaf de polikliniek ontslagen.

Tot slot

In deze folder is een algemeen beeld gegeven van het verloop van de opname en de behandeling. Het kan zijn dat de opname van uw kind anders verloopt dan hier beschreven.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel ons dan gerust van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur. We zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden.

- Polikliniek Kaakchirurgie (078) 6523771
Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Kaakchirurgie, belt u naar dit nummer.
- Polikliniek Kindergeneeskunde (078) 6523370
- Kinderdagbehandeling
Dordwijk (078) 6523413

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Ruimte voor aantekeningen

Albert Schweitzer ziekenhuis
juli 2025
pavo 1720