

Blaasspoelingen met BCG

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U start binnenkort met blaasspoelingen met BCG. De afkorting BCG staat voor Bacillus Calmette-Guérin. Dit is een medicijn dat bestaat uit verzwakte tuberculosebacteriën. Het activeert het afweersysteem, waardoor de kans kleiner is dat de kanker in de blaas terugkomt.

In deze folder leest u welke voorbereidingen nodig zijn, hoe de spoeling verloopt en waar u na de spoeling rekening mee moet houden.

Schema spoeling

U gaat een aantal BCG spoelingen krijgen. Er kan afgeweken worden van dit schema op basis van uw situatie.

Het standaard schema voor één jaar spoelen is:

- Start: 1x per week gedurende 6 weken.
- Na 3 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.
- Na 6 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.
- Na 12 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.

Tussendoor krijgt u geen spoelingen.

Het kan nodig zijn om door te gaan met de blaasspoelingen met een totale duur van 3 jaar. U volgt dan het aanvullende schema:

- Na 18 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.
- Na 24 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.
- Na 30 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.
- Na 36 maanden: 1x per week een spoeling, totaal 3 spoelingen.

We controleren regelmatig uw blaas met een cystoscopie.

De secretaresse maakt voor u de afspraken. Deze krijgt u van haar mee of worden opgestuurd. Bij de eerste spoeling krijgt u verdere uitleg over de spoelingen.

Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

De voorbereiding

Urineweginfectie

Heeft u de dag voor de blaasspoeling een urineweginfectie? Of denkt u die te hebben? Bel dan naar de polikliniek Urologie. Zij zullen u vragen om een potje met urine naar de polikliniek te brengen. Als u een urineweginfectie heeft, dan kan de blaasspoeling misschien niet doorgaan.

Drinken

We adviseren u om 3 uur voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk te drinken.

Plassen

De spoeling wordt uitgevoerd in het ziekenhuis op de polikliniek Urologie. Voorafgaand aan de spoeling vraagt de verpleegkundige u om uit te plassen.

De spoeling

De verpleegkundige brengt u naar de spoelkamer en vraagt u de kleding van uw onderlichaam te laten zakken. De kleding van uw bovenlichaam mag u aanhouden.

Om te voorkomen dat de verpleegkundige in contact komt met de spoelvoeistof, trekt zij beschermende kleding aan: een overschort, mondmasker en (veiligheids)bril.

U gaat om liggen op de behandeltafel. De behandeling wordt gedaan door een verpleegkundige, doktersassistente, verpleegkundig specialist of een arts-assistent. De ingang van uw plasbuis wordt schoongemaakt met een nat gaasje. Daarna wordt een dun slangetje in uw blaas ingebracht. Dit heet een katheter. Het inbrengen van het slangetje kan gevoelig zijn. De achtergebleven urine in uw blaas loopt via de katheter weg. Vervolgens wordt de spoeling aangesloten op de katheter. De spoelvoeistof loopt rustig in uw blaas. Het is een kleine hoeveelheid van 40 ml. Als de spoelvoeistof in uw blaas is gelopen, wordt de katheter met 10 ml zout water nagespoeld. Hierna wordt de katheter verwijderd. Uw onderlichaam wordt gewassen en u krijgt een verbandje. Hierna kunt u naar huis.

U probeert na de spoeling de spoelvoeistof 1 tot maximaal 2 uur in uw blaas te houden. Daarna kunt u uitplassen.

Nazorg

BCG is een behandeling voor blaaskanker. Het is niet goed als anderen met dit middel in aanraking komen. Daarom moet u een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

- Wij adviseren u zittend te plassen.
- Na het plassen moet u uw onderlichaam goed wassen met water. Uw handen wast u met water en zeep.
- Het toilet spoelt u twee keer door met gesloten deksel.
- De eerste 24 uur na de spoeling moet u elke keer als u naar de wc bent geweest, de wc-pot en -bril en het deksel met chloor schoon maken.

- Ga goed drinken (de verpleegkundige vertelt u hoeveel), zodra u de eerste keer na de spoeling heeft geplast.
- Komt u binnen 6 maanden nadat u een spoeling heeft gehad op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost, en heeft u koorts? Meld dan altijd dat u een BCG spoeling heeft gehad.

Bijwerkingen

Een BCG spoeling kan een aantal bijwerkingen hebben:

- Kort na de spoeling kunt u vaker het gevoel hebben dat u moet plassen.
- Kort na de spoeling kunt u een branderig gevoel hebben bij het plassen.
- Na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.
- De dag na de spoeling kunt u zich wat griepig voelen (koorts, spierpijn, niet lekker). Als u meer dan 38,5 graden koorts heeft, belt u overdag de polikliniek Urologie. Buiten openingstijden neemt u contact op met de spoedeisende hulp.

Advies

Het is niet precies bekend hoe lang eventuele resten van de BCG spoeling achterblijven in uw blaas. Wij raden aan om in de week na de blaasspoeling een condoom te gebruiken bij alle seksuele handelingen, ook bij orale seks.

Mocht u een corona vaccinatie krijgen houdt u er dan rekening mee dat deze minimaal 2 weken voor of na de BCG spoeling gegeven moet worden.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust naar de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur. We beantwoorden uw vragen graag.

Ook voor het maken of verzetten van een afspraak bij de polikliniek Urologie belt u op genoemde tijden naar tel. (078) 652 32 80. Als u buiten de genoemde tijden problemen krijgt, belt u naar de Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2026
pavo 0116