

# Drainage

Op de afdeling Radiologie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op [www.asz.nl/brmo](http://www.asz.nl/brmo).

**albert  
schweitzer**



# Inleiding

Binnenkort wordt er bij u een drainage gedaan. Bij een drainage wordt er een drain (slangetje) geplaatst om vocht of vloeistof uit het lichaam af te voeren. Meestal wordt de drain in de buik geplaatst. Dit kan in de vrije buikholtte zijn waar vocht is ontstaan. Er kan ook een drain worden geplaatst in een abces. Dit is een holte, die ontstaan is door een ontsteking en gevuld is met pus.

## Vorbereiding

### Beleving

We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra rekening mee houden.

### Thuis

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan bespreekt de arts die de behandeling aanvraagt met u of en hoelang van tevoren u tijdelijk moet stoppen met de inname van deze medicijnen. Als dit niet met u besproken is, neemt u contact op met uw behandelend arts. Alle andere medicijnen kunt u zoals gebruikelijk innemen.

Wij raden u aan om op de dag van de behandeling geen sieraden te dragen. U kunt ze dan na de behandeling ook niet vergeten.

Als u zwanger bent of denkt het te zijn, wilt u dan vooraf contact met ons opnemen? U hoort dan of de behandeling kan doorgaan.

Voor de drainage moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf drie uur voor aanvang van de behandeling niet meer mag eten en drinken.

### **In het ziekenhuis**

Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt u op de dag van de drainage opgenomen in het ziekenhuis. Hoelang u in het ziekenhuis moet blijven is afhankelijk van de te draineren vloeistof. Op de verpleegafdeling krijgt u een infuusnaald in uw arm en indien nodig wordt er bloed afgenomen om de bloedstolling te bepalen. Als u overgevoelig voor jodium bent, meldt u dit dan voor de behandeling.

## **De drainage**

De drainage wordt gedaan op de afdeling Radiologie door een radioloog. Afhankelijk van de behandelplaats ligt u op uw rug of buik op de behandeltafel.

Om de exacte plaats voor de drain te bepalen wordt eerst een echografie gemaakt. Bij een echografie worden weefsel en organen zichtbaar gemaakt met behulp van geluidsgolven. Als de plaats niet bepaald kan worden met echografie, kan het zijn dat er een CT-scan wordt gedaan. Zowel een echografie als een CT-scan zijn niet pijnlijk.

De plaats van de drain wordt gedesinfecteerd waarna er een steriel laken over u heen wordt gelegd. U krijgt een plaatselijke verdoving.

De te draineren plaats wordt met een naald aangeprikt. Door deze naald wordt een dunne draad in uw lichaam geschoven waarna de naald verwijderd wordt. Over de draad worden slangetjes van verschillende dikte (dilatators) geschoven.

Hierdoor wordt de opening in de huid groter, zodat de drain erover geschoven kan worden.

Het begin van de drain ligt in uw lichaam. Aan het begin van de drain zit een krul zodat de drain goed blijft zitten. Ook wordt de drain aan uw huid vastgemaakt met een hechting. Aan het uiteinde van de drain dat zich buiten uw lichaam bevindt, wordt een opvangzak bevestigd. De drain wordt daarna met een gaasje en een pleister aan uw huid vastgeplakt.

## **Na de drainage**

Na de drainage wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U moet nog twee uur bedrust houden en een uur nuchter blijven. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en hartslag. Als er een drain in de vrije buikholte is gelegd, moet de opvangzak de eerste dag nog op uw bed blijven liggen anders loopt het vocht te snel af. Daarna mag het zakje aan uw bed hangen. Als het zakje bijna vol is vraagt u de verpleegkundige om het opvangzakje te vervangen.

Als de drain geen vloeistof of vocht meer produceert, kan het zijn dat de drain verstopt zit of dat al het vocht is afgelopen. Als al het vocht is afgelopen wordt de drain, in overleg met de behandelend arts, door de verpleegkundige verwijderd.

De behandelend arts bepaalt in overleg met u wanneer u weer naar huis mag.

# Tot slot

**Als u verhinderd bent voor de behandeling, wilt u dit dan zo snel mogelijk bellen naar de afdeling Radiologie? De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.**

Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u naar de afdeling Radiologie bellen, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.

Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze website [www.asz.nl](http://www.asz.nl)

Geef hier uw mening over deze folder: [www.asz.nl/foldertest/](http://www.asz.nl/foldertest/)



Albert Schweitzer ziekenhuis  
Januari 2026  
pavo 0252