

Implantaten

Polikliniek Kaakchirurgie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

U heeft gekozen voor één of meerdere implantaten in uw kaak. In deze folder leest u meer over de behandeling en de periode na de behandeling. Het inbrengen van implantaten wordt gedaan op locatie Dordwijk.

Wat zijn implantaten?

Implantaten zijn 'kunstwortels'. Een implantaat kan in de kaak geplaatst worden om een gebitsprothese meer steun te geven of ter vervanging van een verloren gegane tand of kies.

Vorbereiding

Foto maken

De keuze voor een implantaat gaat altijd in samenwerking met uw tandarts. Er wordt eerst een röntgenfoto gemaakt van uw gebit/kaken. De kaakchirurg kan op deze foto beoordelen of uw kaak geschikt is voor een implantaat.

Machtiging aanvragen

- Als uw onbetande onder/bovenkaak geschikt is voor *meerdere implantaten*, vraagt de kaakchirurg bij uw ziektekostenverzekeraar een machtiging voor deze behandeling aan. De zorgverzekeraar vergoedt alleen onder bepaalde voorwaarden. De aanvraag kan ongeveer 2-4 weken duren. Zodra wij de machtiging hebben ontvangen, maken we met u een afspraak voor de behandeling.

- Voor implantaten in betande kaken kan er geen machtiging worden aangevraagd. U ontvangt van ons vooraf een offerte en achteraf de factuur. Soms is er een gedeeltelijke vergoeding mogelijk. Dit kan per verzekeraar verschillen, daarom raden we u aan om vooraf uit te zoeken hoe dit bij úw verzekeraar geregeld is.

Verdere voorbereiding

- Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de kaakchirurg met u hoe u daar mee om moet gaan.
- Op de polikliniek krijgt u voor de behandeling van ons antibiotica. Heeft u een allergie hiervoor geeft dat dan door.

De behandeling

Het inbrengen van de implantaten wordt poliklinisch gedaan. De kaakchirurg geeft u een plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt, begint de behandeling. Uw tandvlees wordt geopend. Er wordt een gaatje in uw kaakbot geboord. Vervolgens wordt het implantaat in uw kaak geplaatst. Daarna wordt uw tandvlees gehecht. De hechting zal vanzelf oplossen na 1-2 weken.

Het aanbrengen van één of enkele implantaten duurt ongeveer 30-60 minuten. Er wordt na het aanbrengen van de implantaten nog een röntgenfoto gemaakt.

Na de behandeling

Nadat de implantaten zijn ingebracht, kunt u het ziekenhuis verlaten. We adviseren u na deze behandeling zelf geen voertuig te besturen.

Pijn

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn ervaren. U krijgt een recept voor pijnstillers mee. We raden u aan om met deze pijnstiller te beginnen nog voordat de verdoving is uitgewerkt. Dit is ongeveer 2 uur na de ingreep.

Zwelling

Na de behandeling kan uw wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg van de behandeling. Om de zwelling te beperken geven wij u direct ijs mee en kunt u meteen na thuiskomst een coldpack of een washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang houden. We raden aan om een kwartier per keer te koelen. Vervolgens koelt u een kwartier niet en daarna weer wel. Dit houdt u vol totdat u gaat slapen.

Eten en drinken

De eerste 2 dagen niet warm eten en drinken vanwege de kans op een nabloeding.

De eerste twee weken na de behandeling mag u alleen zacht voedsel gebruiken. Geleidelijk kunt u weer normaal voedsel gaan eten. Het is erg belangrijk dat u zich hieraan houdt, omdat het implantaat goed moet vastgroeien in het bot.

Roken

Om de wondgenezing én de ingroei van de implantaten te bevorderen, is het belangrijk dat u niet (meer) rookt. Als u wel rookt, heeft dit nadelige gevolgen voor de wondgenezing en ingroei van uw implantaten.

Mondhygiëne

Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne belangrijk.

- U kunt uw tanden en kiezen poetsen zoals u gewend bent, waarbij u wel wat voorzichtiger bent bij de wond.
- Als u twee of meerdere implantaten in uw onder/bovenkaak heeft gekregen, mag u gedurende 1-2 weken uw onder prothese **niet** dragen.

Lichamelijke inspanning

Zware lichamelijke inspanning en sport zijn soms niet mogelijk. U voelt zelf het beste wanneer een bepaalde houding of activiteit tot klachten leidt. Bij een grote lichamelijke inspanning is de kans op een nabloeding groter. Vermijdt grote lichamelijke inspanning voor minimaal 24 uur na de behandeling.

Koorts

Na de behandeling kunt u wat verhoging hebben. Na 3-4 dagen neemt de verhoging meestal af.

Een arts waarschuwen

We raden u aan om contact op te nemen met de polikliniek Kaakchirurgie als u last krijgt van:

- Koorts boven 38,5°C
- Een forse nabloeding
- Een toename van de zwelling en slikklachten 5 dagen na uw behandeling

Controle

Na uw behandeling krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek Kaakchirurgie.

- De eerste controle is ongeveer 1-2 weken na de behandeling.
- Nadat u voor controle bent geweest kunt u bij de tandarts uw prothese laten aanpassen.
- Als u een implantaat heeft gekregen ter vervanging van een tand of kies, moet het implantaat eerst 3-4 maanden volledig in uw kaak vastgroeien. Pas daarna kunt u bij uw tandarts een afspraak maken voor het maken van een kroon.

Tot slot

In deze folder hebben wij u een algemeen beeld gegeven van het verloop van de behandeling en de periode hierna. Het kan zijn dat uw behandeling anders verloopt dan hier is beschreven. Wij stemmen uw behandelplan af op úw situatie.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? De polikliniek Kaakchirurgie is op werkdagen van 08.00-12.00 en van 13.00-16.30 uur telefonisch bereikbaar, via tel. (078) 652 37 71. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Buiten kantooruren kunt u bij acute problemen bellen naar de afdeling Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/

Albert Schweitzer ziekenhuis
april 2026
pavo 0403