

Roesje bij een bronchoscopie of EBUS

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Er wordt binnenkort bij u een bronchoscopie of EBUS gedaan. In deze folder leest u meer over de sedatie bij dit onderzoek, ook wel het roesje genoemd. Een roesje houdt in dat u wat slaperig wordt. Daardoor merkt u minder van het onderzoek.

Wat is een roesje?

Een roesje is het geven van een slaapmiddel (midazolam). Dit medicijn wordt voor het onderzoek via een infuusnaaldje gegeven. De meeste mensen raken hiervan in (lichte) slaap. Bij sommigen veroorzaakt het geen echte slaap, maar geeft het wel ontspanning. Het is niet te voorspellen wat uw reactie zal zijn. Het roesje wordt door de longarts gegeven.

Een roesje is geen narcose. U blijft zelf ademen.

Voordelen

Het voordeel van het roesje is dat u niet beademd hoeft te worden. Ook kunnen de artsen en verpleegkundigen met u praten tijdens het onderzoek.

De meeste mensen herinneren zich door het roesje achteraf weinig tot niets van het onderzoek.

Nadelen

Door het slaapmiddel gaat u oppervlakkiger ademen. Daardoor heeft u soms extra zuurstof nodig. Dit wordt via een slangetje in uw neus gegeven.

Als het zuurstofgehalte in uw bloed te ver daalt, kan het nodig zijn om de werking van het roesje op te heffen. Dan krijgt u een extra medicijn (flumazenil).

Het slaapmiddel kan een daling van de bloeddruk en hartslag veroorzaken. Als uw bloeddruk daalt, wordt zo nodig vocht via het infuusnaaldje gegeven.

Er is een kans dat u zich verslikt door het roesje. U kunt ook overgevoelig zijn voor het gebruikte slaapmiddel. Als u weet dat u daarvoor overgevoelig bent, moet u ons dit vertellen.

Ook kunt u juist minder gevoelig zijn voor het medicijn. Als u regelmatig slaapmiddelen of alcoholische dranken gebruikt, kan de werking van het roesje minder zijn. De longarts kijkt tijdens het onderzoek of er een extra medicijnen gegeven moet worden.

Sommige mensen reageren wat ontremd door het roesje en zeggen of doen dan dingen die ze anders niet zouden doen.

Heel zelden kunnen er door het roesje problemen ontstaan met de ademhaling of hartfunctie. Dit komt gemiddeld bij drie op de duizend patiënten voor.

Bijzondere omstandigheden

Heeft u een slechte hart- en/of longfunctie? Dan kan de longarts voorafgaand aan het onderzoek besluiten u geen roesje te geven. Dit is omdat het risico op complicaties te groot kan zijn. De arts bespreekt dan met u de mogelijkheid om de scopie zonder roesje te doen.

Vorbereiding

Nuchter zijn

Tot **6** uur vóór het onderzoek mag u nog iets lichts eten of drinken. Daarna moet u nuchter blijven. Zie voor alle voorbereidingen de folder van het onderzoek zelf (bronchoscopie of EBUS).

Vervoer regelen

U krijgt tijdens de behandeling een roesje. Daarom mag u na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen, ook in verband met wettelijke regels (Wegenverkeerswet artikel 8.1). Regelt u daarom vooraf vervoer naar huis.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op het Scopie-Centrum. De verpleegkundige brengt een infuus in, in uw arm. Via het infuus wordt vlak voor het onderzoek een slaapmiddel gegeven, ook wel het roesje genoemd.

De verpleegkundige stelt u enkele vragen. Zij controleert of uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed goed zijn. Deze controles vinden ook tijdens het onderzoek voortdurend plaats.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u op het bed naar de uitslaapkamer gereden. Doordat u een roesje heeft gehad, duurt het nog enige tijd voordat de medicijnen zijn uitgewerkt. als alle controles goed zijn, mag u weer naar huis. Ook al bent u weer wakker, u kunt nog wel enkele uren suf zijn. De medicijnen die u heeft gekregen kunnen uw reactievermogen beïnvloeden.

Dit betekent dat u tot de volgende morgen:

- Niet actief mag deelnemen aan het verkeer.
- Niet mag werken en geen machines mag bedienen.
- Geen belangrijke beslissingen kunt nemen.
- Geen slaapverwekkende en rustgevendende middelen mag gebruiken.
- Geen alcohol mag drinken.

Tot slot

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn om **20 minuten** voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur bellen naar de behandelkamer longgeneeskunde, tel. (078) 654 24 45.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

Albert Schweitzer ziekenhuis
december 2025
pavo 1382